

## Roflumilast en el tratamiento de EPOC.

El Roflumilast es un medicamento que se comercializa en nuestro país para el tratamiento de la EPOC. Existen tres marcas comerciales en venta (Daxas de Takeda; Lemast de Casasco y Plusmuv de Dosa)

En los últimos 2 años han aparecido 2 nuevos medicamentos para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Se trata de dos antimuscarínicos inhalados (bromuro de aclidinio y el bromuro de glicopirronio) que aparecen cuando está por terminar la exclusividad para el tiotropio de marca. Luego se agregó el roflumilast, con un mecanismo de acción diferente al de los medicamentos para EPOC ya conocidos y con la particularidad de su administración oral.



Llama la atención que este último medicamento ya se ha incorporado en las últimas Guías de Práctica Clínica para la EPOC (Global strategy for diagnosis, Management and prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (guía GOLD) y dos guías españolas (guía de EPOC de Guías Salud y Guía GEsEPOC)

El excelente Boletín de información terapéutica de Navarra realizó una revisión de la bibliografía con la finalidad de establecer su relación beneficio/riesgo.

Se observó que en el tratamiento de la EPOC estable roflumilast solo ha mejorado ligeramente la función pulmonar disminuyendo en forma modesta las exacerbaciones, comparado con placebo. No se dispone de datos de eficacia de roflumilast incluido en los regímenes terapéuticos habituales de la práctica clínica. Por otra parte, su perfil de seguridad genera preocupación y está sometido a un extenso plan de gestión de riesgos. No se recomienda su uso, por carecer hasta este momento de suficiente evidencia de una relación beneficio/riesgo adecuada.

*Cecilia Calvo Pita. Roflumilast en el tratamiento de la EPOC estable. Otro ejemplo de posicionamiento precipitado en (algunas) guías de práctica clínica. BIT: Volumen 21, Número 4. Agosto - Octubre 2013*